

A1. Σχολικό βιβλίο σελ.76 θεώρημα ενδιαμέσων τιμών

A2. Σχολικό βιβλίο σελ.155 Ορισμός

A3. Σχολικό βιβλίο σελ.216

A4.

α) Σ β)Σ γ)Λ δ)Λ ε)Σ

ΘΕΜΑ Β

B1

Για να ορίζεται η h πρέπει $h(x) \neq 0$. Είναι

$$h(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow x = 1.$$

Άρα $D_f = (1, +\infty)$. Ο τύπος της f είναι

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}}{\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}} = \frac{x+1}{x-1}$$

Επίσης, $D_r = D_{gh} = D_g \cap D_h = [1, +\infty)$ και ο τύπος της είναι

$$r(x) = g(x)h(x) = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) = (\sqrt{x})^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 = x - \frac{1}{x}$$

B2

Η f είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $(1, +\infty)$ με

$$f'(x) = \frac{(x+1)'(x-1) - (x+1)(x-1)'}{(x-1)^2} = -\frac{2}{(x-1)^2} < 0 \text{ για κάθε } x \in (1, +\infty).$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(1, +\infty)$ άρα και 1-1, επομένως αντιστρέφεται.

Αφού η f είναι συνεχής συνάρτηση, το πεδίο ορισμού της αντίστροφης f^{-1} είναι το σύνολο τιμών της f . Είναι

$$f((1, +\infty)) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)\right) = (1, +\infty),$$

$$\text{αφού } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x} = 1 \text{ και}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty$$

διότι $x - 1 > 0$ όταν $x \rightarrow 1^+$.

Για τον τύπο της αντίστροφης, λύνουμε ως προς x την εξίσωση

$$f(x) = y \Leftrightarrow \frac{x+1}{x-1} = y \Leftrightarrow x = \frac{y+1}{y-1}, y \neq 1$$

Άρα ο τύπος της αντίστροφης είναι $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-1} = f(x)$, $x \in (1, +\infty)$.

B3

Η $r(x)$ είναι συνεχής στο $D_r = [1, +\infty)$ άρα δεν έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες.

Υπολογίζουμε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} r(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{1}{x} \right) = +\infty,$$

επομένως δεν έχει οριζόντιες ασύμπτωτες.

Ελέγχουμε για πλάγιες ασύμπτωτες:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{r(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} = 1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (r(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{1}{x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} = 0$$

Άρα η $y = x$ είναι πλάγια ασύμπτωτη (δεν ελέγχουμε για $x \rightarrow -\infty$ λόγω του πεδίου ορισμού).

B4

Γνωρίζουμε ότι $f^{-1}(f(x)) = x$, επομένως

$$\left(f^{-1}(f(x)) \right)^2 = 1 + 4r(x) \Leftrightarrow x^2 = 1 + 4r(x) \Leftrightarrow 4 \left(1 - \frac{1}{x} \right) + 1 = x^2 \Leftrightarrow x^3 - 4x^2 - x + 4 = 0$$

Οι πιθανές ρίζες είναι οι διαιρέτες του σταθερού όρου 4: $\pm 1, \pm 2, \pm 4$.

Βλέπουμε ότι το 1 είναι προφανής ρίζα και κάνοντας σχήμα Horner, η εξίσωση γράφεται ισοδύναμα

$$(x - 1)(x^2 - 3x - 4) = 0.$$

της οποίας οι ρίζες είναι οι $x = 1$, $x = 4$ και $x = -1$.

Η ρίζα $x = -1$ απορρίπτεται διότι δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού. Άρα λύσεις οι $x = 1$ και $x = 4$.

ΘΕΜΑ Γ

Γ1)

Η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της $[0, +\infty)$ άρα είναι συνεχής και στο $x_0=2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-2x + 4 + e^x) = -4 + 4 + e^2 = e^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (-x^2 + 4x - 3 + \lambda) = -4 + 8 - 3 + \lambda = 1 + \lambda$$

Πρέπει και αρκεί $e^2 = 1 + \lambda \Leftrightarrow e^2 - \lambda - 1 = 0$

Προφανής λύση η $\lambda=0$ είναι μοναδική αφού ισχύει η βασική ανισοτική σχέση $e^x \geq x + 1$ και η ισότητα ισχύει μόνο στο 0

Γ2) Η f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της $[0, +\infty)$

$$f'(x) = \begin{cases} -2, & 0 < x < 2 \\ -2x + 4, & x > 2 \end{cases}$$

Για $x > 2$:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2x = -4 \Leftrightarrow x = 2 \text{ απορρίπτεται}$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow -2x > -4 \Leftrightarrow x < 2 \text{ απορρίπτεται}$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 2$$

Έχουμε $f'(x) < 0$ $x \in (0, 2) \cup (2, +\infty)$ και η f είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$ και στο $x_0=2$. Άρα η f είναι φθίνουσα στο $[0, +\infty)$.

Η παρουσιάζει ολικό μέγιστο το $f(0) = 5$ στην θέση $x_1=0$

Γ3)

α) η f είναι συνεχής στο $[0, 3]$

η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0,2) \cup (2,3)$

Εξετάζουμε την παραγωγισιμότητα στο 2.

Έχουμε:

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-2x+5-1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-2x+4}{x-2} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-2(x-2)}{x-2} = -2$
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2+4x-3-1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2+4x-4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-(x-2)^2}{x-2} = 0$

Το $-2 \neq 0$ άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο 2. Δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις του ΘΜΤ.

Γ3)

β)

Είναι $\lambda_{\Delta\epsilon} = \frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{0-5}{3} = -\frac{5}{3}$

Εξετάζουμε αν υπάρχει $\xi \in (2,3)$ τέτοιο ώστε

$$f'(\xi) = -\frac{5}{3} \Leftrightarrow -2\xi+4 = -\frac{5}{3} \Leftrightarrow -2\xi = -\frac{5}{3} - \frac{12}{3} \Leftrightarrow -2\xi = -\frac{17}{3} \Leftrightarrow \xi = \frac{17}{6} > 2$$

Δεκτό

Γ4)

Έχουμε $y'(t) = 0,5$ μον/sec

Είναι $\epsilon\phi\omega = \frac{AM}{OA} = \frac{y}{2}$

Ως προς t : $\epsilon\phi\omega(t) = \frac{y(t)}{2}$

Παραγωγίζω και έχω: $(1+\epsilon\phi^2\omega(t))\omega'(t) = \frac{y'(t)}{2}$

Την $t=t_0$: $y(t_0)=1$, $x(t_0)=2$, $y'(t_0)=0,5$

$\epsilon\phi\omega(t_0) = \frac{y(t_0)}{2} = \frac{1}{2}$


άρα $\omega(t_0) = \frac{\frac{0,5}{2}}{1+(0,5)^2} = \frac{0,25}{1+0,25} = 0,2 \text{ rad/sec}$

Θέμα Δ

Δ1. f συνεχής και παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$

$$f'(x) = \left(\frac{\ln x + \alpha x}{x}\right)' = \frac{(\ln x + \alpha x)' \cdot x - (\ln x + \alpha x) \cdot (x)'}{x^2} = \frac{\left(\frac{1}{x} + \alpha\right) \cdot x - (\ln x + \alpha x)}{x^2} = \frac{1 + \alpha x - \ln x - \alpha x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}, \quad x > 0$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$$



$f \uparrow$ στο $(0, e]$ και $f \downarrow$ στο $[e, +\infty)$

Η f παρουσιάζει στο $x=e$ ολικό μέγιστο το $f(e) = \frac{\ln e + \alpha \cdot e}{e} \Rightarrow f(x) \leq \frac{1 + \alpha \cdot e}{e}$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$

Από το σύνολο τιμών της f έχουμε ότι $f(x) \leq 1 + \frac{1}{e}$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$

Οπότε πρέπει $\frac{1 + \alpha \cdot e}{e} = 1 + \frac{1}{e} \Leftrightarrow \frac{1}{e} + \alpha = 1 + \frac{1}{e} \Leftrightarrow \alpha = 1$

Επιμέλεια:

Καλαϊτζίδης Θεόδωρος, Πανάγου Γεώργιος, Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Σωτηρόπουλος Άρης, Πασχάλης Νίκας, Σπυρόπουλος Παναγιώτης, Οικονόμου Ελένη, Ντζουροπάνος Δημήτρης, Ντίμερης Σπύρος, Στάκα Ευαγγελία, Χασαλεύρης Θάνος, Σταυρακάκης Γιάννης, Σπανάκης Μιχάλης, Βαρδουλάκης Νίκος, Κολοκυθά Βασιλική, Πρώιας Δημήτρης, Λουλακάς Γιώργος, Ζένιος Παναγιώτης, Πετρά Ζωή, Καραγεώργος Θεμιστοκλής, Καραμπετάκη Δομνίκη

και τα κέντρα ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Πειραιάς, Κερατσίνι Ταμπουρία, Διαδικτυακό, Κερατσίνι Αμφιάλη, Νίκαια, Λαμία, Μοσχάτο, Κατερίνη, Περιστέρι Κέντρο, Καβάλα, Κιάτο, Φιλοθέη Ψυχικό, Περιστέρι Νέα Ζωή